



Сколько не кормить кота перед операцией

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/golodnaya-dieta-pered-operatsiey/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Зачем это нужно: риск аспирации →
- 2 Сколько не кормить и не поить →
- 3 Если кот всё-таки поел — не молчит... →
- 4 Кормление после наркоза: по часам

Если коту назначена операция — от кастрации до чистки зубов, — врач почти наверняка попросит поддержать его голодным перед наркозом. Это не формальность и не перестраховка: пустой желудок напрямую влияет на безопасность анестезии.

Ниже — зачем нужна голодная диета, какие сроки считаются типовыми, что делать, если кот всё же успел поесть, и когда можно снова кормить после операции. Точные сроки под конкретный протокол называет анестезиолог: они зависят от возраста, веса, состояния животного и вида вмешательства.

🔔 Зачем это нужно: риск аспирации

Под наркозом кот теряет глотательный и кашлевой рефлекс — организм временно не может защитить дыхательные пути. Если в этот момент случится рвота или пассивный заброс содержимого желудка в пищевод (реургитация), содержимое может попасть в трахею и лёгкие. Это аспирация, и она грозит аспирационной пневмонией и дыхательной недостаточностью.

Голодная диета уменьшает объём содержимого желудка, а вместе с ним и риск рвоты при вводном наркозе, интубации и в первые часы после операции, пока рефлексы восстановились не полностью. Это стандартная мера безопасности перед любым вмешательством под общей анестезией: кастрацией кота, стерилизацией кошки, чисткой зубов и другими плановыми операциями.

🐾 Сколько не кормить и не поить

Типовой ориентир для взрослой кошки: не кормить за **6–8 часов** до наркоза; конкретное время уточняет врач. Держать кошку без еды сутки «на всякий случай» не нужно и вредно — многосуточное голодание у кошек само по себе опасно для печени.

С водой протокол мягче: часто доступ к воде оставляют почти до визита в клинику или убирают миску за **1–2 часа** до наркоза — жидкость покидает желудок быстрее твёрдой пищи. Режим питья тоже назначает врач, ведущий анестезию.

Отдельная зона внимания — котята, пожилые и ослабленные животные: у них при долгом голоде быстрее падает уровень глюкозы в крови. Котятам интервал без еды обычно назначают короче, чем взрослым кошкам, и определяют его индивидуально на предоперационном осмотре.

Цифры выше — тема для разговора с врачом, а не готовая инструкция. Длительность голода, режим воды и особые условия (диабет, беременность, хронические болезни, приём лекарств по расписанию) называет анестезиолог той клиники, где будет операция. В БиоВет это анестезиология; для большинства плановых вмешательств используется ингаляционный наркоз с управляемой глубиной и быстрым пробуждением. Перед операцией врач также назначает предоперационное обследование — анализы и осмотр, по результатам которых протокол может измениться.

🐾 Если кот всё-таки поел — не молчите

Бывает: утро операции, а кот стащил корм из чужой миски или домочадец покормил его по привычке. Единственно верный шаг — честно сказать врачу, во сколько и сколько кот съел, а не надеяться, что «пронесёт».

Если анестезиолог не знает о полном желудке, он не может подстроить протокол — и риск рвоты на вводимом наркозе остаётся неучтённым. Когда врача предупредили, у него есть варианты: сдвинуть операцию на несколько часов или на другой день, изменить схему подготовки, при необходимости дообследовать животное. Плановое вмешательство почти всегда можно перенести без вреда для здоровья. Позвоните в клинику заранее — телефон и адреса есть в разделе контакты, запись переставят.

🐾 Кормление после наркоза: по часам

Глотательный рефлекс после наркоза восстанавливается не сразу, поэтому ставить миску сразу по приезде домой не стоит. Типовой ориентир, который врач корректирует под конкретный случай: немного воды — когда кот уверенно держит голову и стоит на лапах, обычно через **2–4 часа** после пробуждения; привычный корм маленькой порцией — когда кот сам заинтересовался едой, чаще всего в интервале **6–12 часов**. Первая порция — примерно четверть обычной, дальше по самочувствию.

После стоматологических вмешательств, включая удаление зубного камня, сроки и консистенцию корма врач оговаривает отдельно. Главное правило — смотреть на кошку, а не на часы: сонного, ещё не пришедшего в себя питомца кормить не нужно. Если через сутки после операции кот по-прежнему отказывается от еды и воды, вялый или его рвёт — это повод позвонить в клинику, а не ждать. Что считать тревожным признаком, разобрано в помощнике «Что делать».

❓ Частые вопросы

❓ Что будет, если покормить кота перед наркозом вопреки рекомендации?

Растёт риск рвоты на вводимом наркозе и попадания содержимого желудка в дыхательные пути — вплоть до аспирационной пневмонии. Если кот всё же поел, скажите об этом врачу: плановую операцию, скорее всего, перенесут на безопасное время, и это лучший исход из возможных.

❓ Можно ли давать коту воду утром перед операцией?

Чаще всего вода разрешена дольше, чем еда: миску убирают за **1–2 часа** до наркоза. Но точное время уточняйте у врача, который будет вести анестезию: у котят, пожилых кошек и животных с хроническими болезнями схема отличается.

❓ Нужно ли голодать перед наркозом котёнку так же долго, как взрослой кошке?

Нет, котёнкам обычно назначают более короткий голод: при длительном отказе от еды у них быстро падает уровень глюкозы в крови. Точный интервал определяет врач на предоперационном осмотре — по возрасту, весу и состоянию котёнка.

❓ Что делать, если я не помню, когда кот ел в последний раз?

Позвоните в клинику и опишите ситуацию: когда примерно был доступ к миске, оставался ли корм насыпанным на ночь, есть ли в доме другие животные с общей кормушкой. Врач оценит риск и решит, идти по плану или перенести операцию. Телефоны филиалов — в разделе контакты.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet