



Кошка разлизала шов: что делать

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/koshka-razlizala-shov/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

1 Как оценить шов → 2 Первая помощь дома → 3 Попона и воротник: как подобрать

Шов после стерилизации кошки, кастрации кота или любой другой операции по мере заживления подтягивает и зудит — кошка пытается избавиться от неприятного ощущения и вылизывает рану. Язык у неё покрыт жёсткими роговыми сосочками и работает как тёрка: за несколько минут животное успевает перетереть нить, растащить края и занести в рану микрофлору из пасти.

Разлизанный шов почти всегда требует осмотра, даже если внешне рана выглядит терпимо. Ниже — как понять, насколько всё серьёзно, что сделать прямо сейчас и по каким признакам ехать в клинику немедленно.

🔔 Чем опасно вылизывание

Инфицирование. Слюна не стерильна, а свежая рана и шовный материал — удобные ворота для бактерий. Воспаление нарастает исподволь, за сутки-двое, и вместо спокойного заживления дело доходит до антибиотика — препарат и схему подбирает врач после осмотра, наугад такие лекарства не дают.

Расхождение краёв. Кошка вытягивает нить зубами или трёт шов о поверхности, ткани не успевают срастись, и рана открывается частично или целиком. После полостной операции — например, стерилизации — это опаснее, чем при поверхностном разрезе: там ушита не только кожа, но и мышечная стенка живота.

Как оценить шов

Осмотрите рану при хорошем свете. Наклейку или повязку, если её наложили в клинике, самостоятельно не снимайте.

- ✓ Умеренное покраснение краёв и небольшая припухлость без выделений — обычная реакция тканей в первые дни после операции.
- ✓ Мокнутие, слипшаяся влажная шерсть вокруг шва, прозрачное или мутное отделяемое — рана раздражена слюной или начинается воспаление.
- ✓ Между стежками появились промежутки, кожа не сходится краями — шов разошёлся частично.
- ✓ Видны подлежащие ткани, есть кровотечение, гной или запах — неотложная ситуация.

Всё, кроме первого пункта, — повод показать кошку врачу, а не «понаблюдать ещё пару дней».

Первая помощь дома

- ✓ Наденьте попону или воротник обратно, если их сняли. Это главное действие: оно останавливает дальнейшее повреждение раны.
- ✓ Если шов просто мокрый от слюны и признаков воспаления нет — промокните область чистой салфеткой. Кожу вокруг шва можно протереть водным раствором хлоргексидина 0,05%; саму линию швов и открытые ткани не трогайте.
- ✓ Не наносите мази, зелёнку, спиртовые растворы, присыпки и человеческие обезболивающие: часть препаратов из аптечки для кошек токсична, остальные раздражают ткань и смазывают картину при осмотре.
- ✓ Оставьте кошку в комнате без высоких поверхностей — прыжки и приземления нагружают шов.
- ✓ Не стягивайте разошедшиеся края пластырем: под ним остаётся необработанная рана и закрытая инфекция.

Нужны ли обезболивание и антибиотик, решает врач после осмотра — заочно по фото глубину повреждения не оценить.

Когда ехать срочно

- шов разошёлся, видны подлежащие ткани — тем более после операции на брюшной полости;
- кровотечение не останавливается;
- гнойное или зловонное отделяемое;
- кошка вялая, не ест, прячется, отказывается от воды;
- живот напряжён и болезненный при прикосновении.

В клинике рану обработают и при необходимости ушьют заново — как правило, под седацией или короткой анестезией (анестезиология, хирургия). При выраженном воспалении кошку оставляют в стационаре под наблюдением и инфузиями. Если довезти животное самим невозможно, для первичной оценки можно вызвать ветеринара на дом — но повторное ушивание делают в клинике, где есть операционная.

🛡️ Попона и воротник: как подобрать

Попона — послеоперационный комбинезон, который физически закрывает шов на животе. Удобна после стерилизации и кастрации: кошка двигается свободно и переносит её спокойнее, чем воротник. Проверяйте завязки — растянутую попону животное сдвигает набок и добирается до раны за минуту.

Воротник нужен, когда шов на голове, шее или лапах, а также если кошка научилась подлезать под попону. Край воротника должен выступать за кончик носа — иначе она дотянется языком. Узкий воротник давит на шею, слишком большой мешает есть и пить, поэтому размер подбирают по кошке, а не «на глаз, с запасом».

Носить защиту нужно весь срок, названный врачом при выписке, — ориентировочно до снятия швов, но конкретную дату уточняет врач по типу операции и тому, как идёт заживление. Снимать «на десять минут, чтобы кошка поела спокойно» — самый частый способ потерять шов: разлизывают раны именно в такие паузы. Если сомневаетесь, нужен ли визит прямо сейчас, сориентирует раздел что делать.

❓ Частые вопросы

❓ Можно ли обработать разлизанный шов самостоятельно?

Если рана закрыта и признаков воспаления нет — протрите кожу вокруг шва водным хлоргексидином и верните воротник или попону. Если стежки разошлись, появилось отделяемое или кровь, домашняя обработка проблему не решает: нужен осмотр, а часто и повторное ушивание.

❓ Сколько носить воротник или попону?

Ориентир — до снятия швов, при заживлении без осложнений это обычно около двух недель. Точный срок уточняет врач: после полостной операции и у кошек, которые упорно лижут шов, защиту оставляют дольше.

❓ Кошка перегрызла одну нитку — это опасно?

Линия шва держится за счёт всех стежков сразу, и потеря даже одного ослабляет её: при прыжке или потягивании края могут разойтись. Это повод на внеплановый осмотр, а не ждать планового снятия швов.

❓ Кошка разлизала шов ночью — ждать до утра?

Наденьте защиту, осмотрите рану при свете, изолируйте кошку в тихой комнате. Дальше звоните: клиники сети работают круглосуточно, дежурный врач по описанию скажет, ехать сейчас или можно дождаться утра. Адреса и телефоны — в контактах, стоимость приёма — в прайсе.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet