



Кот отходит от наркоза: что нормально

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/kot-posle-narkoza/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Виды наркоза и почему это важно → 2 Что считается нормой в первые 12–2... → 3 Чем помочь дома →
4 Когда поить и кормить

Первые часы после наркоза пугают владельцев сильнее самой операции: кот шатается, смотрит сквозь вас, жалобно мяукает и не идёт на голос. Чаще всего это нормальная фаза выхода из анестезии, а не осложнение. Она проходит сама, если дать животному тепло, покой и время.

Ниже — что считается нормой, чем помочь дома и по каким признакам нужно везти кота в клинику не откладывая.

📌 Виды наркоза и почему это важно

Скорость выхода зависит от того, чем животное усыпляли. При ингаляционном наркозе (газ через маску или интубационную трубку) препарат выводится через лёгкие с дыханием, поэтому пробуждение обычно быстрее и предсказуемее, чем после инъекционных препаратов, которые перерабатывают печень и почки. Отсюда и репутация ингаляционного наркоза как более мягкого — особенно для пожилых кошек и животных с хроническими болезнями.

Чаще всего протокол комбинированный: премедикация с обезболиванием, вводный инъекционный наркоз, поддержание газом плюс местная анестезия, которая снижает потребность в общих препаратах. Что применяли вашему коту и сколько это выводится, скажет анестезиолог, который вёл операцию.

На плановых вмешательствах — кастрации кота, стерилизации кошки, кастрации кошки — мы работаем с ингаляционным наркозом; подробности протокола — в разделе анестезиологии, про сами операции — в разделе хирургии.

Что считается нормой в первые 12–24 часа

Кот не «просыпается» мгновенно бодрым: контроль над телом возвращается постепенно. Нормальны:

- ✓ шаткая, «пьяная» походка — кот заваливается на бок, промахивается лапой мимо цели;
- ✓ расширенные зрачки и мутный, отсутствующий взгляд, кот может не узнавать хозяина первые часы;
- ✓ хриплое, странное мяуканье или, наоборот, непривычная молчаливость;
- ✓ сонливость и прохладные уши и лапы — терморегуляция восстанавливается не сразу;
- ✓ лёгкая дрожь без судорог;
- ✓ сниженный аппетит и один эпизод рвоты в первые часы.

Обычно основная фаза занимает от нескольких часов до суток, привычное поведение возвращается за **12–24 часа**. У котят, пожилых и полных кошек выход идёт дольше — это тоже вариант нормы, если состояние постепенно улучшается. Ориентир по срокам именно для вашего случая уточняет врач при выписке: после полостной операции восстановление длиннее, чем после кастрации.

Чем помочь дома

Задача первых суток — не лечить, а обеспечить безопасность и покой, пока препараты выводятся.

- ✓ Тепло. Постелите тёплую подстилку, при необходимости положите рядом грелку, обернутую полотенцем, — не вплотную к коже, чтобы кот мог отползти. Укройте лёгким пледом, уберите сквозняки.
- ✓ Пол вместо дивана. Пока координация нарушена, кот падает с высоты и травмируется. Место — на полу в тихом углу; лестницы, подоконники и полки закрыть минимум на сутки.
- ✓ Тишина. Дети и другие животные — подальше, на руки без нужды не брать, специально не будить: сон ускоряет восстановление.
- ✓ Приглушённый свет, пока зрачки расширены.
- ✓ Никаких человеческих обезболивающих. Парацетамол и ибупрофен для кошек ядовиты. Обезболивание назначает только врач — если кажется, что коту больно, звоните в клинику.
- ✓ Шов нельзя давать разлизывать. Обрабатывать его — водным раствором хлоргексидина, если это назначено; нужна ли попона и как часто обрабатывать, говорит оперировавший врач.

Когда поить и кормить

Глотательный рефлекс восстанавливается позже сознания, поэтому ранняя вода и еда рискуют попасть в дыхательные пути. Воду предлагайте небольшими порциями, когда кот уверенно держит голову и стоит на лапах — обычно через несколько часов, точный интервал после конкретного наркоза называет врач. Кормить — когда кот сам заинтересуется едой: небольшая порция привычного корма, без принуждения. Если к концу следующего дня кот так и не поел, покажите его врачу. После стоматологических вмешательств — чистки зубов или удаления зубного камня — сроки и консистенцию корма определяет врач, обычно мягкая еда на несколько дней.

🏠 Что НЕ норма: срочно к врачу

- кот не встаёт и не пытается встать дольше **24 часов** ;
- многократная рвота или рвота с кровью;
- бледные, белые или синюшные дёсны — в норме розовые;
- не мочится дольше **36 часов** , особенно кот: возможна закупорка мочевыводящих путей;
- судороги, тяжёлое или частое дыхание с открытым ртом;
- кровотечение или расхождение шва, отёк и горячая припухлость вокруг него;
- кот остаётся холодным и вялым, несмотря на тепло, либо наоборот — явный жар;
- любое ухудшение вместо постепенного улучшения.

При этих признаках звоните туда, где оперировали, или в ближайшую клинику сети: мы работаем круглосуточно, при осложнениях есть собственный стационар. Если довести кота не получается, выручит вызов ветеринара на дом. Быстро оценить тревожность симптома помогает раздел «Что делать».

❓ Частые вопросы

❓ Сколько кот отходит от наркоза после кастрации?

Шаткость, спутанность и сонливость обычно уходят за несколько часов, привычная активность возвращается в течение суток. После ингаляционного наркоза кошки, как правило, встают на лапы раньше, чем после чисто инъекционного. Если через сутки кот всё ещё «пьяный» и вялый — это повод показаться врачу, а не ждать дальше.

❓ Можно ли давать воду сразу, как кот проснулся?

Нет. Пока кот не держит голову и не стоит уверенно, вода может попасть в дыхательные пути — глотательный рефлекс возвращается позже сознания. Начинайте с пары глотков и следите, чтобы кот не захлёбывался. Если сомневаетесь, подождите ещё час и позвоните в клинику.

❓ Кот не узнаёт меня и странно мяукает — это нормально?

В первые часы да: спутанность, расширенные зрачки и непривычные звуки — обычная реакция на анестетики. Настораживать должно не само поведение, а его сохранение дольше суток или сочетание с рвотой, бледными дёснами и отсутствием мочеиспускания.

❓ Кот упал с дивана, пока отходил от наркоза. Что делать?

Осмотрите его на хромоту, болезненность при осторожном ощупывании, изменившееся дыхание. При любом подозрении на травму — к врачу: под наркозом и сразу после него боль притупляется, и повреждение легко пропустить. Именно поэтому первые сутки кот должен лежать на полу, а не на мебели.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet