



Уход за котом после кастрации по дням

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/koshki/posle-kastratsii-kota/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Первые часы после наркоза → 2 Первые сутки дома → 3 Дни со 2-го по 10-й →
4 Швы: снимать или нет

Кастрация кота — короткая рутинная операция, но именно первые сутки после неё определяют, насколько гладко пройдёт восстановление. Кот выходит из наркоза постепенно, а ранка требует внимания около недели.

Ниже — план по часам и дням: что делать сразу после возвращения из клиники, как пережить первые сутки, на что смотреть со 2-го по **10-й день** и какие признаки нельзя игнорировать.

🏠 Первые часы после наркоза

После кастрации кота животное ещё несколько часов отходит от анестезии. Ориентир нормы простой: с каждым часом движения становятся увереннее, а не наоборот. Первые **2–4 часа** кот шаткий, заваливается на бок, плохо держит равновесие — положите его на пол или низкую лежанку и закройте доступ к лестницам, подоконникам и шкафам. Падение с высоты в этом состоянии опаснее самой операции.

Температура тела после наркоза обычно снижена. Укройте кота лёгким пледом, уберите сквозняки, но не кладите грелку: обездвиженное животное не отползёт от источника тепла и может получить ожог. Воду предлагают, когда кот уверенно держит голову и нормально глотает — точное время зависит от вида анестезии и объёма операции, его называет врач при выписке. Отсутствие аппетита в день операции ожидаемо.

Из ингаляционного наркоза коты, как правило, выходят мягче, чем из внутривенного, но выбор протокола остаётся за анестезиологом — он зависит от возраста, веса и результатов предоперационного обследования.

Первые сутки дома

Коту нужна тихая отдельная комната без других животных и детей, лоток и вода рядом, никаких прыжков и активных игр. Первое кормление — небольшая порция привычного корма, когда кот сам заинтересуется едой. Насильно кормить не нужно; если он не ест дольше суток — звоните в клинику.

Дискомфорт в первые часы возможен. Обезболивание назначает врач: препарат и схему подбирают под конкретного кота с учётом веса и наркоза. Давать человеческие лекарства нельзя — многие из них для кошек токсичны даже в малых количествах. Ранка в первые сутки может слегка сочиться или дать несколько капель крови — это в пределах нормы. Кровь, которая капает непрерывно, — нет.

Дни со 2-го по 10-й

Защитный воротник или попона нужны до заживления ранки, ориентировочно **7–10 дней**; точный срок называет врач на контрольном осмотре. Без защиты даже спокойный кот способен разлизать шов за одну ночь.

Наполнитель на это время меняют на мягкий и беспылевой — бумажный или обычные салфетки. Мелкие гранулы, комкующиеся и минеральные смеси липнут к влажной ранке и раздражают её. Активность ограничивают: прыжки на шкафы, беготня и игры с другими животными — под запретом, пока врач не разрешит вернуться к обычному режиму.

Обработка ранки — по назначению врача. Чаще всего достаточно протирания водным хлоргексидином **0,05%**. Спиртовые растворы и йод сушат и раздражают ткани, а мази и присыпки без назначения наносить не стоит: под ними хуже видно, что происходит с раной.

Швы: снимать или нет

У котов часто применяют технику без наружных швов или рассасывающиеся нити — тогда снимать нечего, ранка затягивается сама. Если наложены обычные швы, их снимают в клинике, обычно на **7–10-й день**; дату называет хирург, ориентируясь на технику операции и то, как идёт заживление. Дома швы не снимают, даже если ранка выглядит зажившей.

Тревожные признаки

Норма первых дней — лёгкая вялость в первые сутки и умеренная припухлость мошонки. Ехать в клинику нужно, если:

- кровотечение из ранки не останавливается;
- кот отказывается от еды дольше **24 часов** ;
- вялость держится дольше **2 суток** ;
- появились рвота, понос, дрожь или явно горячие уши и нос;
- ранка покраснела, отекла, из неё идут мутные выделения или запах;
- кот содрал воротник и травмировал шов;
- кот подолгу тужится в лотке и не мочится.

Ждать до утра в этих случаях не стоит: клиники сети работают круглосуточно, а собственный стационар и хирургическое отделение принимают экстренные случаи в любое время. Короткий чек-лист симптомов, с которыми едут немедленно, собран на странице «Что делать» — держите её под рукой первые дни.

Частые вопросы

Через сколько кот полностью восстанавливается?

Активная фаза — **7–10 дней** , до заживления ранки и снятия воротника; обычное самочувствие возвращается уже на **2–3-й день** . Поведение меняется медленнее: метки, крики и попытки уйти из дома угасают в течение нескольких недель. У взрослых котов с закрепившимися привычками перемены заметны позже, чем у молодых, и часть привычек может остаться.

Можно ли снять воротник раньше срока, если он мешает?

Нет. Кот перестаёт замечать воротник за день-два, а риск разлизать шов сохраняется весь период заживления — одна ночь без защиты может закончиться расхождением краёв раны и повторным визитом к хирургу. Снять воротник раньше можно только по решению врача на осмотре.

Сколько стоит кастрация и осмотр после неё?

Цена зависит от веса кота, техники операции и вида анестезии — актуальные позиции есть на странице цен. Уточняйте при записи, входит ли в стоимость послеоперационный осмотр: чаще всего входит. Адреса и телефоны клиник — на странице контактов.

Кот не ходит в лоток после кастрации — это опасно?

Если кот подолгу сидит в лотке, тужится и не мочится — это повод ехать в клинику сразу, не дожидаясь утра: задержка мочи опасна для жизни. Настораживает и полное отсутствие мочеиспускания в первые сутки после операции. А вот несколько часов без лотка сразу после наркоза — ожидаемо: кот просто мало пил и много спал.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet