



Уход за собакой после стерилизации по дням

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/sobaki/posle-sterilizatsii-sobaki/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Первые сутки: наркоз ещё не отпустил... → 2 Попона — до снятия швов → 3 Контроль шва →
4 Дозированные прогулки → 5 Кормление → 6 Снятие швов и поздние осложнения

Стерилизация суки — полостная операция: хирург удаляет яичники (или яичники вместе с маткой) через разрез на животе. Основную часть проблем после неё дают не сама операция, а первые две недели дома: разлизанный или разошедшийся шов — самая частая причина повторного визита.

Все сроки ниже ориентировочные: если рекомендации хирурга, оперировавшего вашу собаку, отличаются от статьи, ориентируйтесь на них — он видел операционное поле.

🐾 Первые сутки: наркоз ещё не отпустил

Собака возвращается сонной и заторможенной — это ожидаемый эффект анестезии, которую подбирают под вес, породу и состояние конкретного животного (см. ингаляционный наркоз и анестезиологию). Лежанка — на полу, а не на диване: с высоты собака может неудачно прыгнуть. Воду и еду дают по времени, которое назвал врач; животное держат в тепле и не оставляют один на один с детьми и другими питомцами. Дрожь и попытки спрятаться — обычный выход из наркоза, но если собака скулит и не находит себе места, звоните: схему обезболивания корректирует врач.

Если собака не встаёт спустя несколько часов, дышит часто и поверхностно, дёсны бледные или синюшные — не ждите утра. Клиники сети работают круглосуточно, и на первую ночь животное можно оставить под наблюдением в стационаре.

🛡️ Попона — до снятия швов

Главная задача — не дать собаке дотянуться языком до шва: слюна размягчает края раны и заносит бактерии, отсюда большая часть нагноений и расхождений. Попону или послеоперационный комбинезон надевают сразу после приезда домой и снимают только для обработки шва под присмотром — включая ночь, когда хозяин чаще всего не замечает вылизывание. Носить обычно приходится **10–14 дней**, до снятия швов; точный срок называет врач. Если собака упорно срывает попону или стаскивает её зубами, скажите об этом на приёме — иногда надёжнее жёсткий воротник.

🔗 Контроль шва

Шов осматривают минимум раз в день, лучше утром и вечером. В первые дни допустимы лёгкая припухлость по краям, розоватая кожа и скудные прозрачные выделения; что считать нормой именно у вашей собаки, уточняет врач при выписке. Обрабатывать шов раствором хлоргексидина 0,05% можно по схеме, которую дали в клинике. Антибиотики и обезболивающие сами не назначайте и не отменяйте досрочно — препарат, дозу и длительность определяет врач.

Срочно на приём, если появились: гнойные или зловонные выделения, расхождение краёв с видимыми тканями, горячий плотный отёк, резкая боль при касании живота, повышенная температура, рвота или отказ от еды дольше суток. Если сомневаетесь, насколько это срочно, помогает памятка что делать — но при перечисленных признаках правильный ответ всегда «в клинику сегодня».

🐾 Дозированные прогулки

Первые 3–5 дней — только поводок и короткий шаг: до туалета и обратно, без игр, бега, прыжков в машину и на диван, без беготни по лестнице. Дальше длительность прогулок наращивают постепенно, а запрет на прыжки и возню с другими собаками держится весь период заживления — ориентировочно 10–14 дней, точный срок называет оперировавший врач. Крупным и очень активным собакам на лестницах помогает страховка за шлейку. Детей и других питомцев на это время лучше держать отдельно хотя бы в первые дни.

🐶 Кормление

Время первого кормления назначает клиника — обычно через несколько часов после того, как собака устойчиво стоит и не срыгивает воду. Дальше привычный корм маленькими порциями, без смены рациона, костей и новых лакомств в первую неделю. Если стула нет дольше двух суток или в нём кровь — сообщите врачу.

После удаления яичников потребность в калориях снижается, и при прежнем объёме корма собака постепенно набирает вес. Это не неизбежность, а вопрос порции: на контрольном осмотре спросите, когда и насколько уменьшать рацион.

Снятие швов и поздние осложнения

Нерассасывающиеся швы снимают обычно на **10–14-й день**, дату назначает врач по тому, как идёт заживление. При внутриводном косметическом шве снимать может быть нечего, но на контрольный осмотр приехать всё равно нужно: врач смотрит не только на внешний вид, но и на состояние брюшной стенки.

Редкое позднее осложнение — гормонозависимое недержание мочи: собака подтекает во сне или в покое, без позыва, иногда спустя месяцы и годы после операции; чаще у крупных пород. Плохо сделанная операция здесь ни при чём, состояние поддаётся коррекции, схему подбирает врач после осмотра и анализа мочи. Затягивать не стоит: подтекание легко спутать с циститом.

Если поездка в клинику затруднена, для осмотра шва и снятия швов можно вызвать ветеринара на дом. Стоимость приёма — в прайсе, адреса и часы работы всех 20 круглосуточных филиалов — на странице контактов, а специализацию конкретного хирурга можно посмотреть в разделе врачи.

Частые вопросы

Сколько дней собака должна носить попону после стерилизации?

Обычно **10–14 дней**, до снятия швов; точный срок определяет оперировавший врач по типу шва и скорости заживления. Снимать попону раньше не стоит, даже если шов выглядит идеально: риск разлизывания сохраняется, пока кожа не срослась полностью.

Можно ли купать собаку после стерилизации?

Пока шов не снят и не зажил, мочить живот нельзя. Лапы и морду мыть можно, не задевая шов; когда купать целиком, скажет врач на контрольном осмотре.

Почему собака после стерилизации стала вялой и мало ест?

Вялость и сниженный аппетит в первые сутки — обычная реакция на наркоз и операцию. Если собака не ест дольше двух суток, поднялась температура или началась рвота — звоните в клинику, а не ждите улучшения.

Что делать, если собака сорвала попону и разлизала шов?

Наденьте попону обратно и осмотрите шов: покраснение, отёк, разошедшиеся края. Даже если внешне всё цело, лучше показать собаку врачу в ближайшие часы — занесённая слюной инфекция проявляется не сразу.



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet