



Собака после наркоза: восстановление дома

Памятка для владельца от врачей сети клиник «БиоВет» · полная версия и запись:
<https://bio.vet/wiki/uhod/sobaki/sobaka-posle-narkoza/>

🕒 Работаем 24/7

📍 20 клиник в Москве и Реутове

🔬 Своя лаборатория

- 1 Сколько собака отходит от наркоза →
- 2 Дрожь и скулёж — это нормально →
- 3 Вода и еда: график первых суток →
- 4 Прогулки только на поводке →
- 5 Брахицефалы: особый контроль дыхан...

Первые часы после наркоза — самый уязвимый период: координация не вернулась, терморегуляция сбита, рефлексы восстанавливаются постепенно. Обычно к следующему дню собака ведёт себя как раньше, но есть признаки, при которых медлить нельзя. Сроки ниже — усреднённые ориентиры; назначения после конкретной операции даёт лечащий врач при выписке.

📈 Сколько собака отходит от наркоза

Скорость восстановления зависит от размера, возраста, длительности операции и протокола анестезии:

- ✓ Мелкие и средние собаки (до **15–20 кг**) обычно встают на лапы и ориентируются в пространстве через **1–3 часа**, полностью «в себя» приходят к концу первых суток.
- ✓ Крупные и гигантские породы отходят дольше: до уверенной координации нередко проходит **3–6 часов**, остаточная сонливость держится до суток.
- ✓ Пожилые собаки и животные с хроническими болезнями восстанавливаются медленнее: печень и почки выводят препараты не так активно, и врач закладывает это в протокол заранее.

При [ингаляционном наркозе](/uslugi/ingalyatsionnyy-narkoz.html) глубину сна регулируют по ходу операции, а препарат выводится в основном через лёгкие — пробуждение обычно более управляемое. Если через сутки собака вялая, не встаёт или не реагирует на голос, свяжитесь с клиникой.

🧘 Дрожь и скулёж — это нормально

Мышечная дрожь в первые часы — частая и обычно безобидная реакция: тело ещё не восстановило теплообмен. Скулёж и дезориентация тоже не всегда означают боль — чаще это остаточное действие анестетика.

Укройте собаку пледом, уложите на мягкую подстилку в тихом месте без сквозняков, не пускайте к ней детей и других животных. На руки без нужды не берите: координация нарушена, падение с рук или дивана опаснее самого наркоза. Если дрожь идёт вместе с вскриками при прикосновении к шву, стонами дольше двух-трёх часов или явным беспокойством — звоните в клинику. Обезболивание подбирает только врач; человеческие препараты для собак токсичны.

🐕 Вода и еда: график первых суток

Общая схема, если врач при выписке не назначил другую:

- ✓ Вода — небольшими порциями примерно через **1-2 часа** после пробуждения, когда собака уверенно держит голову; если рвоты нет, дальше вода в свободном доступе.
- ✓ Еда — первый лёгкий приём (около трети порции, легкоусвояемый корм) через **6-8 часов**, если собака бодрa и не срыгивает. Привычный рацион — со следующего дня.
- ✓ Однократная рвота после пробуждения не тревожна. Повторная рвота, отказ от воды дольше **12 часов** или отсутствие аппетита к вечеру следующего дня — повод позвонить в клинику.

После операций на желудочно-кишечном тракте (например, при [завороте желудка] (/wiki/bolezni/sobaki/zavorot-zheludka-u-sobak/)) общая схема не работает: сроки и состав кормления задаёт лечащий врач.

🐕 Прогулки только на поводке

Первые дни (обычно 3-5, после [ортопедических операций] (/uslugi/priem-ortopeda.html)) дольше — срок называет хирург) собаку выгуливают только на коротком поводке, без спуска и без игр: координация подводит неожиданно, а рывок или прыжок могут привести к расхождению шва. Лестницы — с подстраховкой, запрыгивать на диван и в машину нельзя.

Первый выход — не раньше, чем собака уверенно ходит по дому, и по знакомому короткому маршруту. Шов нельзя мочить и давать разлизывать: для обработки обычно достаточно раствора хлоргексидина, для защиты — попона или воротник. После [остеосинтеза] (/wiki/bolezni/sobaki/osteosintez-u-sobak-i-koshek/) и других операций на костях нагрузки возвращают по плану [реабилитации] (/napravleniya/reabilitatsiya/).

🐾 Брахицефалы: особый контроль дыхания

Мопсы, французские и английские бульдоги, пекинесы — группа риска при любой анестезии: узкие дыхательные пути и удлинённое мягкое нёбо повышают вероятность затруднённого дыхания именно на выходе из наркоза, когда мышцы глотки ещё расслаблены.

Первые часы такую собаку не оставляют без присмотра: следите за дыханием, держите голову и шею приподнятыми, не допускайте перегрева. Хрип, синюшность языка и дёсен, тяжёлый вдох — повод ехать в клинику немедленно. Поэтому в [анестезиологии] (/napravleniya/anesteziologiya/) протокол для брахицефалов подбирают индивидуально, а после операции таких пациентов дольше наблюдают в [стационаре] (/napravleniya/statsionar/).

🚨 Тревожные признаки: когда обращаться к врачу

- Дыхание с хрипами, свистом или паузами дольше нескольких секунд.
- Синюшный или бледный цвет языка и дёсен.
- Судороги, потеря сознания или отсутствие реакции на голос дольше нескольких часов.
- Кровотечение из шва, сильный отёк, расхождение краёв раны.
- Отказ от воды дольше **12 часов** или от еды дольше суток, повторная рвота, вздутый твёрдый живот.

При любом из этих признаков не ждите планового осмотра — звоните сразу, 8 (495) 323-71-71: все 20 клиник сети работают круглосуточно, а если довести собаку не получается, возможен [выезд врача на дом] (/uslugi/vyzov-veterinara-na-dom.html). Быстро оценить симптом помогает раздел [«Что делать»] (/chto-delat/).

❓ Частые вопросы

❓ Сколько собака спит после наркоза?

В первые сутки повышенная сонливость — норма, собака может проспять большую часть дня, будить её не нужно. Важно другое: сон должен переходить в обычный, с реакцией на голос и прикосновение. Реакции нет — звоните врачу.

❓ Можно ли оставлять собаку одну сразу после наркоза?

Первые часы — нет, особенно брахицефалов и животных после длительных операций: именно тогда возможны падения, рвота и проблемы с дыханием. Дальше, при стабильном состоянии, короткие отлучки допустимы, но наблюдать за водой, едой и швом нужно минимум сутки.

❓ Почему собака ведёт себя странно после наркоза?

Дезориентация, спутанность, нетипичная реакция на хозяина — обычное остаточное действие анестетиков на нервную систему. Как правило, проходит за несколько часов. Если странности держатся дольше суток, нужен осмотр.

❓ Когда можно мыть собаку и снимать попону?

Купание откладывают до заживления шва, попону или воротник носят до снятия швов — дату называет хирург на контрольном осмотре. До этого шов держат сухим и осматривают каждый день. Стоимость перевязок — в разделе [цен](/price/), записаться на контроль можно к [врачам сети](/vrachi/).



Остались вопросы — мы на связи круглосуточно.

Наведите камеру на код: полная статья и запись на приём. Сеть ветклиник «БиоВет», Москва и Реутов · 8 (495) 323-71-71 · bio.vet